

化学療法（エンコラフェニブ + ビニメチニブ + セツキシマブ）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 () 回目
身長 ()cm	アービタックス投与量 (400mg/m ²) : ()mg/body
体重 ()kg	ビラフトビ1日投与量 (300mg/body) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	メクトビ1日投与量 (90mg/body) : ()mg/body

レジメ	メインルート	内服
	①	①
	生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本	レスタミン錠(10mg) 5錠 内服
	点滴 30分	
	②	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 約 15分	
	③	
	アービタックス ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 合計600mLにして使用	
	点滴 2時間	
	外来治療においては 2クール目以降は1時間半でも可能です	
	④	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 1時間	
		内服
		ビラフトビカプセル(75mg) カプセル ビラフトビカプセル(50mg) カプセル (1日1回 毎日内服)
		メクトビ錠(15mg) 朝 0錠 夕 0錠 (1日2回 毎日内服)
	↓ 投薬	
	2週間	
	2週に1回投薬 以上を可能な限り繰り返す	