

化学療法（イリノテカン + シスプラチン）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()	()	クール目
身長 ()cm		Cr ()	mg/dL
体重 ()kg		イリノテカン投与量 (60mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

1日目	2日目	3日目
内服 イメンドカプセルセット 1日目	内服 イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠	内服 イメンドカプセルセット 午前中 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠(0.5mg) 昼 4錠
① イメンド内服後、以下開始 ソルデム1(200mL) 1本 硫酸Mg(20mL) 0.5本 点滴 40分	① ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間	① ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間
② 5%ブドウ糖液(100mL) 1本 アロキシ(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 デカドロン(2mg) 2本 点滴 20分	② ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間	② ソルアセトD(500mL) 1本 点滴 2時間
③ イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 1時間半	③ ③ ③ ソルデム3A(500mL) 1本 点滴 2時間 終了後へパロック、または抜針	③ ③ ③ ソルデム3A(500mL) 1本 点滴 2時間 終了後抜針
④ ソルデム3A(500mL) 1V マンニトール 100mL 点滴 1時間半		
⑤ シスプラチン ()mg 生理食塩液(500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間		
⑥⑦ ヴィーンF(500mL) 2本 マンニトール 200mL 点滴 2本で4時間 終了後へパロック、または抜針		

化学療法（イリノテカン + シスプラチン）

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()		()クール目
身長 ()cm		Cr ()	()mg/dL
体重 ()kg		イリノテカン投与量 (60mg/m ²) : ()	()mg/body
体表面積 ()m ²		シスプラチン投与量 (60mg/m ²) : ()	()mg/body

レジメ

8日目	15日目
<p>メインルート</p> <p>① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>② イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間半</p> <p>③ 生理食塩液(50mL) 1本</p>	<p>メインルート</p> <p>① グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1V</p> <p style="text-align: center;">点滴 30分</p> <p>② イリノテカン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本</p> <p style="text-align: center;">点滴 1時間半</p> <p>③ 生理食塩液(50mL) 1本</p>

