

化学療法 (ペムプロリズマブ + DC + ベバシズマブ)

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	キイトルーダ投与量 (200mg/body) :	( )	mg/body
身長 ( )cm	ドセタキセル投与量 (60mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体重 ( )kg	カルボプラチン投与量 (AUC:5) :	( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	アバスチン投与量 (15mg/kg) :	( )	mg/body

レジメ

**メインルート(PVCフリー・フィルター付き)**

①  
 生理食塩液(100mL) 1V  
 点滴 30分

②  
 キイトルーダ ( )mg  
 生理食塩液(100mL) 1V  
 点滴 30分

③  
 生理食塩液(50mL) 1V  
 点滴 約 15分

**内服**

①  
 グラニセトロンバッグ(100mL) 1本      アプレピタントカプセルセット 1日目  
 デカドロン(8mg) 1本  
 点滴 1時間

②  
 ドセタキセル ( )mg  
 生理食塩液(250mL) 1本  
 点滴 1時間

③  
 カルボプラチン ( )mg  
 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  
 点滴 約 2時間

④  
 アバスチン ( )mg  
 生理食塩液(100mL) 1本  
 点滴 1時間半

⑤  
 生理食塩液(50mL) 1本

↓ 投薬

3~4週間

3~4週に1回投薬  
合計3~6クール施行

**内服**

アプレピタントカプセル 午前中  
 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠  
 昼 4錠

(点滴翌日より 2日間)