

化学療法 (ペムプロリズマブ + TC + ベバシズマブ)

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	キイトルーダ投与量 (200mg/body) :	( )	mg/body
身長 ( )cm	パクリタキセル投与量 (180mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体重 ( )kg	カルボプラチン投与量 (AUC:5) :	( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	アバスチン投与量 (15mg/kg) :	( )	mg/body

レジメ

**①** **メインルート(PVCフリー・フィルター付き)**  
 生理食塩液(100mL) 1V  
 点滴 30分

**②**  
 キイトルーダ ( )mg  
 生理食塩液(100mL) 1V  
 点滴 30分

**③**  
 生理食塩液(50mL) 1V  
 点滴 約 15分

**④**  
 グラセトロンバッグ(100mL) 1本  
 デカドロン(8mg) 1本  
 ガスター(20mg) 1本  
 点滴 1時間

**⑤**  
 パクリタキセル ( )mg  
 生理食塩液(500mL) 1本  
 点滴 約 3時間

**⑥**  
 カルボプラチン ( )mg  
 5%ブドウ糖液(500mL) 1本  
 点滴 約 2時間

**⑦**  
 アバスチン ( )mg  
 生理食塩液(100mL) 1本  
 点滴 1時間半

**⑧**  
 5%ブドウ糖液(250mL) 1本  
 点滴 1時間

**内服**  
**④**  
 レスタミン錠(10mg) 5錠 内服  
 アプレピタントカプセルセット 1日目

**内服**  
 アプレピタントカプセル 午前中  
 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠  
 昼 4錠

↓ 投薬 ↓

3~4週間

3~4週に1回投薬  
 合計3~6クール施行

(点滴翌日より2日間)