

化学療法 (パンプロリズマブ + TC)

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	キイトルーダ投与量 (200mg/body) : ()mg/body
体重 ()kg	パクリタキセル投与量 (180mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	カルボプラチン投与量 (AUC:5) : ()mg/body

レジメ

メインルート(PVCフリー・フィルター付き)

①
 生理食塩液(100mL) 1V
 点滴 30分

②
 キイトルーダ ()mg
 生理食塩液(100mL) 1V
 点滴 30分

③
 生理食塩液(50mL) 1V
 点滴 約 15分

④
 グラセトロンバッグ(100mL) 1本
 デカドロン(8mg) 1本
 ガスター(20mg) 1本
 点滴 1時間

⑤
 パクリタキセル ()mg
 生理食塩液(500mL) 1本
 点滴 約 3時間

⑥
 カルボプラチン ()mg
 5%ブドウ糖液(500mL) 1本
 点滴 約 2時間

⑦
 ソルアセトD(500mL) 1本
 点滴 1時間40分

内服
 ④
 レスタミン錠(10mg) 5錠 内服
 アプレピタントカプセルセット 1日目

投薬
 3~4週間

3~4週に1回投薬
 合計3~6クール施行

内服
 アプレピタントカプセル 午前中
 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠
 昼 4錠

(点滴翌日より2日間)