

標準療法 (TIP : パクリタキセル + イホスファミド + シスプラチン)

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	パクリタキセル投与量 (175~210mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		)mg/body
身長 ( )cm	シスプラチン投与量 (25mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		)mg/body
体重 ( )kg	イホマイド投与量 (1200~1500mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		)mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	ウロミテキサン1回投与量 (400~500mg) : ( 500		)mg/body

レジメ          <b>Ⅲ</b> <b>Ⅳ</b> <b>Ⅰ</b>	<b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b> <b>①</b> グラニセトロンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 2本 ガスター(20mg) 1本  点滴 30分	<b>内服</b> <b>①</b> レスタミン錠(10mg) 5錠 内服
	<b>②</b> パクリタキセル ( )mg 生理食塩液(500mL) 1本  点滴 約 3時間	
	<b>③</b> ソルアセトD(500mL) 1本  点滴 2時間	
	<b>④</b> ヘパロックシリンジ 1本	

1週(4~5日間)投薬、2~3週休薬  
 3~4週間で1クール

