


化学療法（カペシタビン + ゾルベツキシマブ）

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目
身長 ()cm	ピロイ投与量 (800mg/m ² → 600mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		

レジメ	メインルート	内服
	① 生理食塩液(100mL) 1本 パロノセトロン(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 デカドロン(2mg) 2本 点滴 1時間	レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 アプレピタントカプセルセット 1日目
	② ピロイ ()mg 注射用水(20mL) 3本 生理食塩液(500mL) 1本 点滴 4時間半以上	
	③ 生理食塩液(50mL) 1本	
	内服 ゼローダ錠(300) 朝 0錠 夕 0錠 (1日目の夕方より15日目の朝まで)	
	内服 アプレピタントカプセル 午前中 (点滴翌日より2日間)	



ゾルベツキシマブは1日目のみ
 カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで
 2週間投薬、1週間休薬
 アプレピタント内服は初日より3日間

 以上3週間で1クール