

## 化学療法 (DOS : ドセタキセル + オキサリプラチン + S-1)

ID ( )	患者名 ( )
生年月日 ( )	年齢 ( )
身長 ( )cm	ドセタキセル投与量 (50mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body
体重 ( )kg	オキサリプラチン投与量 (100mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	エスワン1日投与量 (80mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body

### レジメ

#### メインルート

#### 内服

①  
 グラニセロンバッグ(100mL) 1本  
 デカドロン(8mg) 1本

アプレピタントカプセルセット 1日目

点滴 1時間

②  
 ドセタキセル ( )mg  
 5%ブドウ糖液(250mL) 1本

点滴 1時間

③  
 オキサリプラチン ( )mg  
 5%ブドウ糖液(500mL) 1本

点滴 2時間

④  
 生理食塩液(50mL) 1本



#### 内服

エスワン配合OD錠 ( ) 朝 0錠  
 夕 0錠

(1日目の夕方より15日目の朝まで)

#### 内服

アプレピタントカプセル 午前中  
 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠  
 昼 4錠

(点滴翌日より2日間)

ドセタキセルおよびオキサリプラチンは1日目のみ  
 S-1内服は1日目の夕から15日目の朝まで  
 2週間投薬、1週間休薬  
 アプレピタント内服は点滴日より3日間  
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間  
 以上3週間で1クール