


化学療法 (XELOX + ニボルマブ)

ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	オプジーボ投与量 (360mg/body) :	()mg/body
体重 ()kg	オキサリプラチン投与量 (130mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²	ゼローダ1日投与量 (2000mg/m ²) :	()mg/body

レジメ	メインルート(PVCフリー・フィルター付き)	内服
①	グラニセトンバッグ(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 1時間	アプレピタントカプセルセット 1日目
②	生理食塩液(50mL) 1本 点滴 約 15分	
③	オプジーボ ()mg 生理食塩液(100mL) 1本 点滴 30分	
④	生理食塩液(50mL) 1本 点滴 30分	
⑤	オキサリプラチン ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 2時間	
⑥	生理食塩液(50mL) 1本	



点滴 ↓

2週間内服 → 1週間休薬

オキサリプラチンおよびニボルマブは1日目のみ
 カペシタビン内服は1日目の夕から15日目の朝まで
 2週間投薬、1週間休薬
 アプレピタント内服は点滴日より3日間
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間

 以上3週間で1クール

内服	
ゼローダ錠(300)	朝 0錠 夕 0錠
(1日目の夕方より15日目の朝まで)	
内服	
アプレピタントカプセル	午前中
デカドロン錠(0.5mg)	朝 4錠 昼 4錠
(点滴翌日より2日間)	