


## 化学療法 (mFOLFOX6 + ソルベツキシマブ)

ID ( )	患者名 ( )	( )	回目
生年月日 ( )	ピロイ投与量 (800mg/m <sup>2</sup> → 400mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body
身長 ( )cm	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body
体重 ( )kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	オキサリプラチン投与量 (85mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) : ( )		mg/body

### レジメ

1 日 目	メインルート	内服
	①	
	生理食塩液(100mL) 1本 パロノセトロン(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 デカドロン(2mg) 2本  点滴 1時間	レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 アブレピタントカプセルセット 1日目
	②	
	ピロイ ( )mg 注射用水(20mL) 2本 生理食塩液(500mL) 350mL  点滴 4時間半以上	
	③	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	終了後へパロック、または抜針	



### 化学療法 (mFOLFOX6 + ソルベツキシマブ)

ID ( )	患者名 ( )	( )	回目
生年月日 ( )	ピロイ投与量 (800mg/m <sup>2</sup> → 400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
身長 ( )cm	レボホリナート投与量 (200mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体重 ( )kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	オキサリプラチン投与量 (85mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body
	5-FU(静注)投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) :	( )	mg/body

レジメ

<b>2 日 目</b>	<b>メインルート</b> ① 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本  点滴 30分	<b>内服</b> アプレピタントカプセルセット 2日目
	② レボホリナート ( )mg 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本  点滴 2時間	<b>側管</b> ② オキサリプラチン ( )mg 5%ブドウ糖液 (250mL) 1本  点滴 2時間
	③ 5-FU ( )mg 5%ブドウ糖液 (500mL) 1本  点滴 46時間	③ 5-FU ( )mg 生理食塩液 (50mL) 1本  点滴 5分以内
<b>3 日 目</b>	5-FU継続	<b>内服</b> ④ アプレピタントカプセル 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 4錠
<b>4 日 目</b>	⑥ 生理食塩液 (50mL) 1本  終了	⑤ デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 デカドロン錠 (0.5mg) 昼 4錠