


化学療法 (sLV5FU2 + ゾルベツキシマブ)

ID ()	患者名 () ()	回目
生年月日 ()	ピロイ投与量 (800mg/m ² → 400mg/m ²) : ()	mg/body
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) : ()	mg/body

レジメ

1 日 目	メインルート	内服
	①	
	生理食塩液(100mL) 1本 パロノセトロン(0.75mg) 1本 デカドロン(8mg) 1本 デカドロン(2mg) 2本 点滴 1時間	レスタミン錠(10mg) 5錠 内服 アプレピタントカプセルセット 1日目
②		
	ピロイ ()mg 注射用水(20mL) 2本 生理食塩液(500mL) 350mL 点滴 4時間半以上	
③		
	生理食塩液(50mL) 1本	
終了後へパロック、または抜針		



化学療法 (sLV5FU2 + ソルベツキシマブ)

ID ()	患者名 ()	()	回目
生年月日 ()	ビロイ投与量 (800mg/m ² → 400mg/m ²) :	()	mg/body
身長 ()cm	レボホリナート投与量 (200mg/m ²) :	()	mg/body
体重 ()kg	5-FU(持続)投与量 (2400mg/m ²) :	()	mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU(静注)投与量 (400mg/m ²) :	()	mg/body

レジメ

2 日 目	メインルート ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分	内服 アプレピタントカプセルセット 2日目
	② レボホリナート ()mg 5%ブドウ糖液(250mL) 1本 点滴 2時間	
	③ 5-FU ()mg 5%ブドウ糖液(500mL) 1本 点滴 46時間	側管 ③' 5-FU ()mg 生理食塩液(50mL) 1本 点滴 5分以内
3 日 目	5-FU継続	内服 アプレピタントカプセル 午前中
4 日 目	⑥ 生理食塩液(50mL) 1本 終了	