

化学療法 (デュルバルマブ + シスプラチン + ゲムシタビン)

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	イミフィンジ投与量 (1500mg/body) : ()mg/body
体重 ()kg	シスプラチン投与量 (25mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	ゲムシタビン投与量 (1000mg/m ²) : ()mg/body

レジメ	1日目	8日目
	<p>メインルート</p> <p>①② ソルアセトD (500mL) 2本 点滴 2本で5時間</p> <p>内服 アプレピタントカプセル 1日目 アプレピタント内服とほぼ同時に以下開始</p> <p>側管</p> <p>① グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 1時間</p> <p>② イミフィンジ ()mg 生理食塩液 (250mL) 1V 点滴 1時間</p> <p>③ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 約 2時間</p> <p>④ ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 点滴 30分</p> <p>内服 アプレピタントカプセル 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠</p> <p>(点滴翌日より 2日間)</p>	<p>メインルート</p> <p>①② ソルアセトD (500mL) 2本 点滴 2本で4時間</p> <p>内服 アプレピタントカプセル 1日目 アプレピタント内服とほぼ同時に以下開始</p> <p>側管</p> <p>① グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 1時間</p> <p>② シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 約 2時間</p> <p>③ ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 点滴 30分</p> <p>内服 アプレピタントカプセル 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠</p> <p>(点滴翌日より 2日間)</p>
		<p>↓ 投薬 ↓ 投薬</p> <p>1週間 → 1週間 → 1週間</p> <p>デュルバルマブは1日目のみ シスプラチンとゲムシタビンは1日目および8日目 以上3週間で1クール</p>