


## 化学療法（デュルバルマブ + ゲムシタビン）

ID ( )	患者名 ( )
生年月日 ( )	年齢 ( ) クール目
身長 ( )cm	イミフィンジ投与量 (1500mg/body) : ( )mg/body
体重 ( )kg	ゲムシタビン投与量 (1000mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>	

レジメ	1日目	8日目
	<b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b> <b>①</b> 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 30分	<b>メインルート(PVCフリー・フィルター付き)</b> <b>①</b> 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本  点滴 30分
	<b>②</b> イミフィンジ ( )mg 生理食塩液(250mL) 1V  点滴 1時間	<b>②</b> ゲムシタビン ( )mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本  点滴 30分
	<b>③</b> ゲムシタビン ( )mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本  点滴 30分	<b>③</b> 生理食塩液(50mL) 1本
	<b>④</b> 生理食塩液(50mL) 1本	
		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           デュルバルマブは1日目のみ            シスプラチンとゲムシタビンは1日目および8日目              以上3週間で1クール         </div>