

化学療法（パンプロリズマブ + シスプラチン + ゲムシタビン）

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 () クール目
身長 ()cm	キイトルーダ投与量 (200mg/body) : ()mg/body
体重 ()kg	シスプラチン投与量 (25mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	ゲムシタビン投与量 (1000mg/m ²) : ()mg/body

レジメ	1日目	8日目
	メインルート ①② ソルアセトD (500mL) 2本 点滴 2本で5時間	メインルート ①② ソルアセトD (500mL) 2本 点滴 2本で4時間
	内服 アプレピタントカプセル 1日目 アプレピタント内服とほぼ同時に以下開始	内服 アプレピタントカプセル 1日目 アプレピタント内服とほぼ同時に以下開始
	側管 ① グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 1時間	側管 ① グラニセトロンバッグ (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 1時間
	② キイトルーダ ()mg 生理食塩液 (250mL) 1V 点滴 30分	② シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 約 2時間
	③ 生理食塩液 (50mL) 1V 点滴 約 15分	③ ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 点滴 30分
	④ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 点滴 約 2時間	内服 アプレピタントカプセル 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠
	⑤ ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 点滴 30分	(点滴翌日より 2日間)
	内服 アプレピタントカプセル 午前中 デカドロン錠 (0.5mg) 朝 4錠 昼 4錠 (点滴翌日より 2日間)	
		デュルバルマブは1日目のみ シスプラチンとゲムシタビンは1日目および8日目 以上3週間で1クール