


化学療法（ペムプロリスマブ + ゲムシタビン）

| | |
|------------------------|---|
| ID () | 患者名 () |
| 生年月日 () | 年齢 () クール目 |
| 身長 ()cm | キイトルーダ投与量 (200mg/body) : ()mg/body |
| 体重 ()kg | ゲムシタビン投与量 (1000mg/m ²) : ()mg/body |
| 体表面積 ()m ² | |

| レジメ | 1日目 | 8日目 |
|-----|---|---|
| | メインルート(PVCフリー・フィルター付き) ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 | メインルート(PVCフリー・フィルター付き) ① 生理食塩液(100mL) 1本 デカドロン(8mg) 1本 点滴 30分 |
| | ② キイトルーダ ()mg 生理食塩液(250mL) 1V 点滴 30分 | ② ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本 点滴 30分 |
| | ③ 生理食塩液(50mL) 1V 点滴 約 15分 | ③ 生理食塩液(50mL) 1本 |
| | ④ ゲムシタビン ()mg 5%ブドウ糖液(100mL) 1本 点滴 30分 | |
| | ⑤ 生理食塩液(50mL) 1本 | |
| | |  <p> デュルバルマブは1日目のみ ゲムシタビンは1日目および8日目 以上3週間で1クール </p> |