

化学療法 (ストレプトゾシン + 5-FU)

ID ( )	患者名 ( )		
生年月日 ( )	年齢 ( )	( )	クール目
身長 ( )cm		Cr ( )	mg/dL
体重 ( )kg		ザノサー投与量 (500mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		5-FU投与量 (400mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body

レジメ	1日目	2日目 ~ 5日目
	<b>メインルート</b> ① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	<b>メインルート</b> ① ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
	② 生理食塩液 (100mL) 1本 パロノセトロン (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 30分	② 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分
	③ ザノサー ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分	③ ザノサー ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分
	④ 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分	④ 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分
	⑤ 5-FU ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 約 30分	⑤ 5-FU ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 約 30分
	⑥ 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分	⑥ 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分

投薬

1週間

5週間

1週 (5日間) 投薬、5週休薬  
 6週間で1クール  
 以上を可能な限り繰り返す