

### 化学療法（ストレプトゾシン）

ID ( )	患者名 ( )	
生年月日 ( )	年齢 ( )	クール目
身長 ( )cm		Cr ( )mg/dL
体重 ( )kg	ザノサー投与量 (500mg/m <sup>2</sup> ) : ( )mg/body	
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		

レジメ	1日目	2日目 ~ 5日目
	<b>メインルート</b> ① ソリアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間	<b>メインルート</b> ① ソリアセトD (500mL) 1本 点滴 2時間
	② 生理食塩液 (100mL) 1本 パロノセトロン (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 30分	② 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分
	③ ザノサー ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分	③ ザノサー ( )mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分
	④ 生理食塩液 (250mL) 1本 点滴 1時間	④ 生理食塩液 (250mL) 1本 点滴 1時間

投薬

1週間

5週間

1週 (5日間) 投薬、5週休薬  
 6週間で1クール  
 以上を可能な限り繰り返す