社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 SAISEIKAI SENDAI HOSPITAL 無断転用禁止

# 化学療法（ドキソルビシン + イホスファミド）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ID（　　） | 患者名（　　） | （　　）クール目 | |
| 生年月日（　　） | 年齢 | Cr（　　）mg/dL | |
| 身長（　　）cm | ドキソルビシン投与量（20mg/$m^2$）：（　　）mg/body | | |
| 体重（　　）kg | イホマイド投与量（2000mg/$m^2$）：（　　）mg/body | | |
| 体表面積（　　）$m^2$ | ウロミテキサン1回投与量（600mg/body）：（600）mg/body | | |

**レジメ**

1日目 ～ 3日目

**メインルート**

①
ソルデム1（500mL）　1本
メイロン（20mL）　1本

点滴　2時間

②
グラニセトロンバッグ（100mL）　1本
デカドロン（8mg）　1本

点滴　30分

③
ドキソルビシン　（　　）mg
生理食塩液（500mL）　1本

点滴　2時間

④
生理食塩液（50mL）　1本

点滴　約 15分

⑤
イホマイド　（　　）mg
ウロミテキサン　（600）mg
生理食塩液（500mL）　1本

点滴　約 3時間

⑥
ソルデム1（500mL）　1本

点滴　2時間

⑦
ソルデム1（500mL）　1本

点滴　ウロミテキサン終了まで

終了

**内服**

アプレピタントカプセルセット

1日目は開始1時間半後
2～3日目は午前中

1週（5日間）投薬、2週休薬
3週間で1クール

**側管**

①´
ウロミテキサン　（600）mg
生理食塩液（20mL）　1本

イホマイド開始4時間後 注射

②´
ウロミテキサン　（600）mg
生理食塩液（20mL）　1本

イホマイド開始8時間後 注射

社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院 SAISEIKAI SENDAI HOSPITAL 無断転用禁止

# 化学療法（ドキソルビシン + イホスファミド）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ID（　　） | 患者名（　　） | （　　）クール目 | |
| 生年月日（　　） | 年齢 | Cr（　　）mg/dL | |
| 身長（　　）cm | ドキソルビシン投与量（20mg/$m^2$）：（　　）mg/body | | |
| 体重（　　）kg | イホマイド投与量（2000mg/$m^2$）：（　　）mg/body | | |
| 体表面積（　　）$m^2$ | ウロミテキサン1回投与量（600mg/body）：（　600　）mg/body | | |

**レジメ**

**4日目 ～ 5日目**

**メインルート**

①
生理食塩液（500mL）　1本

点滴　2時間

②
ソルデム1（500mL）　1本
メイロン（20mL）　1本

点滴　2時間

③
グラニセトロンバッグ（100mL）　1本
デカドロン（8mg）　1本

点滴　30分

④
イホマイド　（　　）mg
ウロミテキサン　（　600　）mg
生理食塩液（500mL）　1本

点滴　約 3時間

⑤
ソルデム1（500mL）　1本

点滴　2時間

⑥
ソルデム1（500mL）　1本

点滴　ウロミテキサン終了まで

↓

終了

1週（5日間）投薬、2週休薬
3週間で1クール

**側管**

①´
ウロミテキサン　（　600　）mg
生理食塩液（20mL）　1本

イホマイド開始4時間後 注射

②´
ウロミテキサン　（　600　）mg
生理食塩液（20mL）　1本

イホマイド開始8時間後 注射