

### 化学療法（プレッツキシマブ ベドチン + AVd）

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )		ドキシソピシン投与量 (25mg/m <sup>2</sup> ): ( )	mg/body
身長 ( )cm		エクザール投与量 (6mg/m <sup>2</sup> ): ( )	mg/body
体重 ( )kg		ダカルバジン投与量 (250mg/m <sup>2</sup> ): ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		アドセトリス投与量 (1.2mg/kg): ( )	mg/body

レジメ	メインルート	内服
<b>①</b>		
	生理食塩液(100mL) 1本	アプレピタントカプセル 1日目
	パロノセトロン(0.75mg) 1本	
	デカドロン(8mg) 1本	
	デカドロン(2mg) 2本	
	点滴 1時間	
<b>②</b>		
	ドキシソピシン ( )mg	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 15分	
<b>③</b>		
	エクザール ( )mg	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 30分	
<b>④</b>		
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 約 15分	
<b>⑤</b>		
	ダカルバジン ( )mg	
	注射用水(20mL) 2本	
	5%ブドウ糖液(100mL) 1本	
	点滴 約 45分	
<b>⑥</b>		
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 約 15分	
<b>⑦</b>		
	アドセトリス ( )mg	
	注射用水(20mL) 2本	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 約 30分	
<b>⑧</b>		
	生理食塩液(50mL) 1本	

ドキシソピシン・プレオマイシン・ダカルバジン  
 およびプレッツキシマブ ベドチンは1日目と15日目  
 アプレピタント内服は点滴日より3日間  
 デカドロン内服は点滴翌日より2日間  
 以上4週間で1クール、合計6クール施行

**内服**  
 アプレピタントカプセル 午前中  
 デカドロン錠(0.5mg) 朝 4錠  
 昼 4錠

(点滴翌日より 2日間)