

化学療法（プレッツキシマブ ベドチン + CHP）

ID ()	患者名 ()	()	クール目
生年月日 ()		アドセトリス投与量 (1.8mg/kg) : ()	mg/body
身長 ()cm		ドキシルピシン投与量 (50mg/m ²) : ()	mg/body
体重 ()kg		エンドキサン投与量 (750mg/m ²) : ()	mg/body
体表面積 ()m ²		プレドニゾン1日投与量 (100mg) : (100)	mg/body

レジメ

メインルート

①

生理食塩液 (100mL)	1本
パロノセトロン (0.75mg)	1本
水溶性プレドニン (100)	mg

点滴 30分

②

アドセトリス ()	mg
注射用水 (20mL)	2本
生理食塩液 (100mL)	1本

点滴 約 30分

③

生理食塩液 (50mL)	1本
--------------	----

点滴 約 15分

④

ドキシルピシン ()	mg
生理食塩液 (100mL)	1本

点滴 30分

⑤

エンドキサン ()	mg
生理食塩液 (250mL)	1本

点滴 1時間

⑥

ソルデム3A (500mL)	1本
メイロン (20mL)	1本

点滴 2時間

内服

プレドニゾン錠 (5mg)	朝 12錠
	昼 8錠

(2日目 ~ 5日目)

点滴 ↓

4日間内服 → 16日間休薬

プレッツキシマブ ベドチン・ドキシルピシン・シクロホスファミドは初日のみ
 プレドニゾンは初日に点滴、翌日より4日間内服
 以上3週間で1クール、合計6~8クール施行

※ プレドニゾンは省略されることがあります