

## 化学療法 (MPEC)

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )	オンコピン投与量 ( $0.7\text{mg}/\text{m}^2$ ): ( )		)mg/body
身長 ( )cm	プレドニゾン1日投与量 ( $20\text{mg}/\text{m}^2$ ): ( 30 )		)mg/body
体重 ( )kg	エトポシド投与量 ( $70\text{mg}/\text{m}^2$ ): ( )		)mg/body
体表面積 ( ) $\text{m}^2$	エンドキサン投与量 ( $200\text{mg}/\text{m}^2$ ): ( )		)mg/body

レジメ

### メインルート

①

生理食塩液(100mL)	1本
パロノセトロン(0.75mg)	1本
水溶性プレドニン ( 30 )	mg

点滴 30分

②

メソトレキセート ( )	mg
生理食塩液(100mL)	1本

点滴 30分

③

エトポシド ( )	mg
5%ブドウ糖液(250mL)	1本

点滴 1時間

④


エンドキサン ( )	mg
生理食塩液(250mL)	1本

点滴 1時間

⑤

ソルデム1(200mL)	1本
メイロン(20mL)	1本

点滴 1時間



週1回投薬  
以上を可能な限り繰り返す