

## 化学療法（ポラツズマブ ベドチン + CHP）

ID ( )	患者名 ( )	( )	クール目
生年月日 ( )		ポライビー投与量 (1.8mg/kg) : ( )	mg/body
身長 ( )cm		ドキシルピシン投与量 (50mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体重 ( )kg		エンドキサソ投与量 (750mg/m <sup>2</sup> ) : ( )	mg/body
体表面積 ( )m <sup>2</sup>		プレドニゾン1日投与量 (100mg) : ( 100 )	mg/body

レジメ	メインルート	内服
	①	①
	生理食塩液(100mL) 1本	レスタミン錠(10mg) 5錠
	パロノセトロン(0.75mg) 1本	カロナール錠(200mg) 2錠 内服
	水溶性プレドニン ( 100 )mg	
	点滴 30分	
	②	
	ポライビー ( )mg	
	注射用水(20mL) 1本	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 1時間半	
	③	
	生理食塩液(50mL) 1本	
	点滴 約 15分	
	④	
	ドキシルピシン ( )mg	
	生理食塩液(100mL) 1本	
	点滴 30分	
	⑤	
	エンドキサソ ( )mg	
	生理食塩液(250mL) 1本	
	点滴 1時間	
	⑥	
	ソルデム3A(500mL) 1本	
	メイロン(20mL) 1本	
	点滴 2時間	
	内服	
	プレドニゾン錠(5mg) 朝 12錠	
	屋 8錠	
	(2日目 ~ 5日目)	

点滴 ↓

4日間内服 → 16日間休薬

ポラツズマブ ベドチン・ドキシルピシン・シクロホスファミドは初日のみ  
 プレドニゾンは初日に点滴、翌日より4日間内服  
 以上3週間で1クール、合計6クール施行

※ プレドニゾンは省略されることがあります