

化学療法 (5-FU + シスプラチン + ニボルマブ)


ID ()	患者名 ()	
生年月日 ()	年齢 ()	クール目 ()
身長 ()cm	オブジーボ投与量 (240mg/body) :	()mg/body
体重 ()kg	シスプラチン投与量 (80mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU投与量 (800mg/m ²) :	()mg/body

レジメ

1日目	2日目 ~ 5日目
メインルート ① 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分 ② オブジーボ ()mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分 ③ 生理食塩液 (50mL) 1本 ④ ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分 ⑤ 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 パロノセトロン (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 約 30分 ⑥ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半 ⑦ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間 ⑧ 5-FU ()mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 翌朝まで	内服 ① アプレピタントカプセル (80mg) 午前中 (2日目と3日目のみ) メインルート ① 5-FU mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 24時間 側管 ① 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分 ② ソルデム1 (500mL) 1本 点滴 2時間 ③ ソルデム1 (500mL) 1本 点滴 2時間 6日目 メインルート ① 生理食塩液 (50mL) 1本
側管 ⑧ ヴィーンF (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 2時間 ⑨ ヴィーンF (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 2時間	

化学療法 (5-FU + シスプラチン + ニボルマブ)

ID ()	患者名 ()		
生年月日 ()	年齢 ()	クール目	
身長 ()cm		オブジーボ投与量 (240mg/body) :	()mg/body
体重 ()kg		シスプラチン投与量 (80mg/m ²) :	()mg/body
体表面積 ()m ²		5-FU投与量 (800mg/m ²) :	()mg/body

レジメ 1 5 日 目	<p>メインルート</p> <p>①</p> <p>生理食塩液(100mL) 1本</p> <p>点滴 30分</p> <p>②</p> <p>オブジーボ ()mg 生理食塩液(100mL) 1本</p> <p>点滴 30分</p> <p>③</p> <p>生理食塩液(50mL) 1本</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ニボルマブは1日目および15日目 CDDPは1日目のみ 5-FUは1週(5日間)投薬、3週休薬 以上4週間で1クール </div>
---	--