

化学療法 (5-FU + シスプラチン + ペムブロリズマブ)

ID ()	患者名 ()
生年月日 ()	年齢 ()
身長 ()cm	キイトルーダ投与量 (200mg/body) : ()mg/body
体重 ()kg	シスプラチン投与量 (80mg/m ²) : ()mg/body
体表面積 ()m ²	5-FU投与量 (800mg/m ²) : ()mg/body

レジメ

1日目	2日目 ~ 5日目
メインルート ① 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分 ② キイトルーダ ()mg 生理食塩液 (100mL) 1本 点滴 30分 ③ 生理食塩液 (50mL) 1本 ④ ソルデム1 (200mL) 1本 硫酸Mg (20mL) 0.5本 点滴 約 50分 ⑤ 5%ブドウ糖液 (100mL) 1本 パロノセトロン (0.75mg) 1本 デカドロン (8mg) 1本 デカドロン (2mg) 2本 点滴 約 30分 ⑥ ソルデム3A (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 1時間半 ⑦ シスプラチン ()mg 生理食塩液 (500mL) 1本 合計600mLにして使用 点滴 2時間 ⑧ 5-FU ()mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 翌朝まで	内服 ① アプレピタントカプセル (80mg) 午前中 (2日目と3日目のみ) メインルート ① 5-FU mg ソルアセトD (500mL) 1本 点滴 24時間 側管 ① 生理食塩液 (100mL) 1本 デカドロン (8mg) 1本 点滴 30分 ② ソルデム1 (500mL) 1本 点滴 2時間 ③ ソルデム1 (500mL) 1本 点滴 2時間 6日目 メインルート ① 生理食塩液 (50mL) 1本
投薬 1週間 → 2週間 1週(5日間)投薬、2週休薬 3週間で1クール、合計6クール施行	
側管 ⑧ ヴィーンF (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 2時間 ⑨ ヴィーンF (500mL) 1本 マンニトール 100mL 点滴 2時間	



社会福祉法人
財団法人
済生会川内病院
SAISEIKAI SENDAI HOSPITAL

無断転用禁止

