

## 化学療法 (mDCF : ドセタキセル + シスプラチン + 5-FU)

|                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| ID ( )                 | 患者名 ( ) ( )                            | クール 目   |
| 生年月日 ( )               | 年齢                                     |         |
| 身長 ( )cm               | ドセタキセル投与量 (60mg/m <sup>2</sup> ) : ( ) | mg/body |
| 体重 ( )kg               | シスプラチン投与量 (6mg/m <sup>2</sup> ) : ( )  | mg/body |
| 体表面積 ( )m <sup>2</sup> | 5-FU投与量 (350mg/m <sup>2</sup> ) : ( )  | mg/body |

### レジメ

|                      |  |  |   |   |
|----------------------|--|--|---|---|
| <b>1<br/>日<br/>目</b> | <b>メインルート</b><br>①<br>グラニセトロンバッグ(100mL) 1本<br>デカドロン(8mg) 1本<br><br>点滴 30分<br><br><b>側管</b><br>②<br>ドセタキセル ( )mg<br>生理食塩液(100mL) 1本<br><br>点滴 1時間半<br><br>③<br>シスプラチン ( )mg<br>生理食塩液(100mL) 1本<br><br>点滴 2時間<br><br>④⑤<br>ソルデム3A(500mL) 2本<br><br>点滴 翌朝まで | ②'<br>5-FU ( )mg<br>ソルアセットD(500mL) 1本<br><br>点滴 翌朝まで | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>投薬</b><br/>         1週間 → 2週間       </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         1週(5日間)投薬、2週休薬<br/>         3週間で1クール<br/>         2クール施行後、継続判断       </div> |
| <b>2<br/>日<br/>目</b> | ①<br>グラニセトロンバッグ(100mL) 1本<br>デカドロン(8mg) 1本<br><br>点滴 30分   | ①'<br>5-FU ( )mg<br>ソルアセットD(500mL) 1本<br><br>点滴 24時間 |   |   |
| <b>5<br/>日<br/>目</b> | ②<br>シスプラチン ( )mg<br>生理食塩液(100mL) 1本<br><br>点滴 2時間<br><br>③④<br>ソルデム3A(500mL) 2本<br><br>点滴 翌朝まで  |  |   | (通常4日目の開始前に採血があります)   |
| <b>6<br/>日<br/>目</b> |  | ①'<br>生理食塩液(50mL) 1本                                 |   |   |
|                      | 終了   |  |   |   |